

Rescate Lipídico

TRATAMIENTO PARA EL PARO CARDIACO **INDUCIDO POR ANESTESICO LOCAL**

POR FAVOR MANTENGA ESTE PROTOCOLO
ADJUNTO A LA BOLSA O FRASCO DE LIPIDOS

En caso de paro cardíaco inducido por anestésico local que no responde al tratamiento standard, a parte de la reanimación cardiopulmonar, los lípidos al 20% para infusión endovenosa deben ser administrados de acuerdo con el siguiente régimen:

- Lípidos al 20% 1.5 mL/kg inyección rápida durante 1 minuto
- Seguido inmediatamente por una infusión a 0.25 mL/kg/min,
- Continúe el masaje cardíaco (el lípido tiene que circular)
- Repetir una inyección rápida cada 3-5 minutos llegando a los 3 mL/Kg. dosis total en inyección rápida hasta que la circulación recomience
- Continuar la infusión hasta que se establezca estabilidad hemodinámica. Aumentar la velocidad a 0.5 mL/kg/min si la presión arterial baja.
- La dosis total máxima recomendada es 8 mL/kg

En la práctica, en la reanimación de un adulto que pesa 70 Kg:

- Tome una bolsa o frasco de 500ml de lípidos al 20% para una infusión endovenosa y una jeringa de 50 ml.
- Prepare 50 ml de lípidos de la bolsa o frasco y adminístrelo en inyección rápida, repita la operación otra vez
- Después introduzca un gotero en la bolsa o frasco de lípidos y déjelo correr en forma intravenosa durante los próximos 15 minutos
- Repetir la inyección rápida inicial dos veces mas – si la circulación espontánea no ha vuelto.

Si usa lípidos para infusión intravenosa para tratar un caso de toxicidad de anestésico local por favor infórmenos a través de la página Web.

En nuestro medio se comercializan dos formas de lípidos al 20 % para infusión endovenosa (para alimentación parenteral) de los laboratorios Braun y Fresenius.

www.lipidrescue.org.