

## Consenso sobre coagulación

# Consenso sobre coagulación – Sociedad Europea de Anestesiología

### **Heparina No Fraccionada/Heparina Sódica (dosis profilácticas <15000 IU por día)**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 4-6 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 1 h.

### **Heparina No Fraccionada/Heparina Sódica (dosis terapéuticas)**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: I.V. 4-6 hs. – S.C. 8-12 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 1 h.

### **Heparina de Bajo Peso Molecular (dosis profilácticas)**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 12 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 4 hs.

### **Heparina de Bajo Peso Molecular (dosis terapéuticas)**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 24 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 4 hs.

### **Fondaparina (para profilaxis. 2,5 mg/24hs)**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 36-42 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 6-12 hs.

### **Rivaroxaban (dosis profilaxis. 10 mg q.d.)**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 22-26 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 4-6 hs.

### **Apixaban (dosis profilaxis. 2,5 mg b.i.d.)**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 26-30 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 4-6 hs.

### **Dabigatran (dosis profilaxis. 150-220 mg)**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: Contraindicada cualquier manipulación
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 6 hs.

## **Cumarínicos**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: INR < 1,4
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural
- 

## **Hirudina (lepirudin, desirudin)**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 8-10 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 2-4 hs.

## **Argatroban**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 4 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: 2 hs.

## **AAS**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: NO precisa retirada
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: NO precisa retirada

## **Clopidogrel**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 7 días
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural

## **Ticlopidina**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 10 días
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural

## **Prasugrel**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 7-10 días
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: Reiniciar 6 hs. después de la retirada del catéter

## **Ticagrelor**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 5 días
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: Reiniciar 6 hs. después de la retirada del catéter

## **Cilostazol**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: 42 hs.
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: Reiniciar 5 hs. después de la retirada del catéter

## **AINE's**

- Retirar antes de la punción o inserción del catéter epidural: NO precisa retirada
- Reiniciar después de la punción o retirada del catéter epidural: NO precisa retirada